

# TIMPANOPLASTIA Y/O CIRUGÍA DEL OÍDO



+ Dieta normal después de las primeras 24h.



+ Tratamiento farmacológico

+ Analgésicos prescritos por el cirujano.

+ En algunas ocasiones se prescribe tratamiento antibiótico.

+ En algunas ocasiones se prescribe tratamiento antivertiginoso.



+ Entra dentro de la normalidad:

+ Sensación de mareo e incluso vértigo rotatorio con náuseas o vómitos los primeros 3-4 días. En este caso se recomienda reposo y tratamiento antivertiginoso.

+ Supuración ótica a través del tapón o apósito que se haya colocado.

+ Una vez retirado el taponamiento ótico puede haber también supuración y sensación de oído tapado. Éstas pueden mantenerse durante las primeras 3-4 semanas postoperatorias.

+ Si se ha hecho un abordaje retroauricular puede haber un leve desplazamiento del pavellón auricular hacia fuera que se corregirá espontáneamente en pocas semanas.



**OTORRINO**  
MANRESA

C/ Carrer dels Caputxins, 16  
08241 Manresa, Barcelona  
**938 74 40 50**  
hola@otorrinomanresa.com

## SEPTOPLASTIA Y/O CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL

+ En muy raras ocasiones se realiza una incisión detrás de la oreja para acceder al oído. En estos casos se puede colocar un vendaje circular alrededor de la cabeza que no debe manipularse ni mojarse hasta su retirada en la consulta. Una vez retirado el vendaje en la primera visita postoperatoria todavía deben quitarse los puntos/grapas que pueda haber en la herida y el taponamiento ótico. Esto se realizará en una segunda visita postoperatoria pasada la primera semana.



+ Debe consultar con el médico o con un servicio de urgencias en caso de:

+ Vértigo severo con náuseas/vómitos pasados los tres primeros días de la cirugía.

+ Sangrado ótico persistente.

+ Síntomas de parálisis facial (desviación de la comisura labial, imposibilidad de arrugar la frente o de cerrar el párpado, etc.)



C/ Carrer dels Caputxins, 16  
08241 Manresa, Barcelona  
**938 74 40 50**  
hola@otorrinomanresa.com